

# Practices Book

# Оперативно и деликатно

Сочетанный протокол применения префиллера, биоревитализанта и пилинга для выравнивания микрорельефа, улучшения состояния кожи и устранения тёмных кругов под глазами.

## Введение

Сегодня всё более актуален тренд, который наметился ещё 5–7 лет назад, — на деликатность, малую инвазивность, уменьшение числа сеансов процедур, сокращение или отсутствие реабилитационных последствий. Одним словом, современный пациент всё больше ждёт от врача-косметолога процедур, отвечающих требованиям социальной сохранности своей внешности.

Понимая эти тенденции, индустрия красоты динамично меняется и предлагает специалистам новые готовые решения в виде инновационных продуктов, аппаратных методов, необычных протоколов сочетанной терапии.

В рамках мастер-класса мы рассмотрим авторскую методику, разработанную экспертами компании «СеллАрт» и включающую в себя одномоментное применение нескольких препаратов в составе одной процедуры.



Сергей Казаков

врач-косметолог,  
Москва

@vivacylab.ru




1а. До



1b



1с




**Рис. 1. Лицо.** Точка 1 — 2–3 см выше хвоста брови, объём препарата 0,1 мл; точка 2 — средняя треть скуловой дуги, объём препарата 0,2 мл; точка 3 — на 1 см кпереди от козелка уха, объём препарата 0,2 мл; точка 4 — средняя треть носогубной складки, объём препарата 0,2 мл; точка 5 — 1–2 см выше угла нижней челюсти, объём препарата 0,2 мл; точка 6 — 1 см ниже угла рта, объём препарата 0,1 мл



1d



1е



**Рис. 2. Шея-декольте.** Точка 1 — под подбородком, объём препарата 0,1 мл; точка 2 — на середине расстояния от подбородка до угла нижней челюсти, объём препарата 0,1 мл; точка 3 — под углом нижней челюсти, объём препарата 0,1 мл; точки 4, 5, 6 — на равном расстоянии друг от друга по внутреннему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы, объём препарата 0,1 мл в каждую точку; точка 7 — в яремной ямке, объём препарата 0,1 мл; точки 8, 9, 10, 11 — в проекции прикрепления ключиц и рёбер к груди, объём препарата 0,1 мл в каждую точку

## Клинический случай

Пациентка, 32 года, обратилась с жалобами на усталый внешний вид, тёмные круги вокруг глаз, неравномерный тон кожи, единичные высыпания, незначительные провисания мягких тканей в средней и нижней третях лица. Анамнез без особенностей. Противопоказания не выявлены.

В данном случае тактика коррекции была выбрана исходя из поставленных задач, реальной клинической ситуации, анамнеза, показаний и противопоказаний пациента.

Назначение чёрного солевого пилинга DSA (DeepSkinArt) Black было продиктовано необходимостью выровнять микрорельеф и тон кожи, устранить высыпания и глубокие загрязнения. Инъекции скинбустера-префиллера Repart®PG оказались необходимы для нормализации баланса синтеза и распада компонентов межклеточного вещества дермы, улучшения качества подкожного слоя и микроциркуляции. Инъекции Repart® 6 Delicate были назначены с целью улучшения состояния кожи вокруг глаз и устранения тёмных кругов.




Рис. 3. Точка 1 — медиальный угол глаза, объём препарата 0,05–0,1 мл; точка 2 — нижнелатеральный край нижнего века, объём препарата 0,05–0,1 мл; точка 3 — 1–2 см от медиального угла глаза, объём препарата 0,05–0,1 мл



## Материалы и методы

В процедуру вошли три препарата: скинбустер-префиллер Repart®PG, Repart® 6 Delicate и чёрный солевой химический пилинг DSA Black. Такой выбор основан на физико-химических и биологических свойствах этих продуктов.

Repart®PG — уникальный препарат, не имеющий аналогов на российском рынке. Префиллер-скинбустер на основе гиалуроновой кислоты 3,0 МДа 2,2%, дополненный безопасным стабилизатором полиэтиленгликолем в концентрации 0,65% (безопасный комплексообразователь, используемый в медицине и фармацевтике). Сочетание ГК и полиэтиленгликоля превращает продукт в комбинированный гидрогель, резистентный к действию ферментов и обладающий пролонгированным биологическим действием.

Важными особенностями Repart®PG являются:

- высокая комфортность процедуры для пациента,
- короткий курс процедур (1–2 процедуры),
- низкий риск реабилитационных последствий в виде бугорков и/или папул,
- длительность процедуры до 10 минут,
- отсутствие необходимости применения топического анестезирующего препарата,
- ярко выраженный и длительный результат.

Скинбустер Repart®PG обладает умеренной волюмизирующей способностью и может использоваться как лёгкий филлер. Показаниями к применению будут как профилактика возрастных изменений мягких тканей лица, шеи, декольте и кожи тыльной поверхности кистей рук, так и корректирующие мероприятия при заметных и явных признаках старения, связанные с дермато- и липоатрофией. Препарат отлично подходит пациентам с сильной занятостью и дефицитом времени. Варианты техник применения Repart®PG: микропапульная, микроболусная, с помощью канюли.

Repart® 6 Delicate — идеальный биоревитализант для деликатных зон. Представляет собой низкоконцентрированный продукт на основе гиалуроновой кислоты 1,2 МДа с концентрацией 0,5%. Благодаря своей высокой текучести препарат максимально быстро распределяется в дерме и оказывает немедленные эффекты, при этом папулы контурируют в местах введения всего несколько часов.

Гиалуроновая кислота быстро включается в процессы метаболизма, что приводит к моментальному увлажнению, мягкому стимулированию клеток и улучшению микроциркуляции. Невысокая концентрация гиалуроната позволяет добиться качественного ухода за кожей, особенно в деликатных зонах шеи, декольте, губ и периорбитальной области. Обеспечивает быстрый освежающий и увлажняющий эффект.

Особый интерес применение Repart® 6 Delicate представляет в периорбитальной области, где он может вводиться по специальным точкам, предложенным специалистами компании «СеллАрт». Такой приём уже показал отличные результаты в работе с тёмными кругами вокруг глаз, связанными с застойными явлениями. Характеристики препарата позволяют включать его в любой протокол инъекционных процедур в качестве универсального биоревитализанта для деликатных зон.

Ключевой ингредиент солевого пилинга DSA Black — аммониевая соль трихлоруксусной кислоты, которая активируется при нанесении на кожу с участием перекиси водорода. Состав дополнен койевой кислотой, оказывающей депигментирующее действие, и чёрным активированным бамбуковым углём, который обладает сорбирующими, противомикробными и противовоспалительными свойствами.

Благодаря такому сочетанию ингредиентов пилинг решает проблему гиперсекреции сальных желёз, абсорбирует избыток кожного сала, сужает поры, устраняет чёрные точки и проявления акне, сокращает глубину морщин и улучшает цвет лица, оказывает мощное детоксицирующее и глубокое очищающее действие. Уникальным свойством данного продукта является возможность проведения химической шлифовки кожи.

Кислородная гель-маска Oxygen Gel Mask содержит перфтордекалин, который обогащает ткани кислородом, активизирует обменные процессы, ускоряет выработку собственного коллагена, препятствует образованию посттравматической пигментации. Другие активные ингредиенты маски улучшают процессы регенерации кожных покровов и локальную микроциркуляцию, уменьшают покраснение после процедур, смягчают кожу и восстанавливают её гидробаланс. Маска имеет гелевую текстуру и не требует удаления с поверхности кожи.

Данное средство рекомендуется применять после любых других процедур, в том числе инъекционных. Поскольку солевые химические пилинги DSA требуют низких температур при постоянном хранении, перед процедурой рекомендуется довести содержимое флакона до комнатной температуры, после чего извлечь необходимый объём с помощью шприца с иглой.



## Протокол процедуры

1. Очистить кожу лица, шеи и декольте с помощью разрыхляющей пенки Cleansing Foam DSA, в состав которой входит молочная кислота и ферментированный экстракт граната.
2. Тщательно просушить кожу.
3. Капельно нанести чёрный солевой пилинг DSA Black, равномерно распределить продукт по всей поверхности кожи и впитать его до полного прекращения скольжения. Сразу нанести второй слой таким же образом. Для обработки кожи лица, шеи и декольте в два слоя необходимо 2,5 мл пилинга. Время экспозиции отсутствует. Проводить пилинг рекомендовано в нитриловых перчатках.
4. Полностью удалить состав с поверхности кожи водой.
5. Просушить кожу.
6. Обработать кожу антисептическим раствором.
7. Провести инъекции Repart®PG по биоэстетическим точкам<sup>[Рис. 1]</sup>. Техника введения — микроболюсно. Уровень введения — внутрикожно/подкожно. Придавить каждый микроболюс для равномерного распределения препарата.
8. Провести инъекции Repart® 6 Delicate в соответствии со схемой на рис. 2. Техника введения — микроболюсно. Уровень введения — внутрикожно/подкожно.
9. Обработать кожу антисептическим раствором. Дождаться полной остановки капиллярного кровотечения.
10. Нанести кислородную гель-маску с перфтордекалином Oxygen Gel Mask на 10–15 минут. Остатки маски впитать в кожу.
11. Нанести защитное средство.

Рекомендуемый курс: 1–2 сеанса с интервалом 3–4 недели. При необходимости инъекции Repart® 6 Delicate в периорбитальной области и чёрный солевой химический пилинг DSA Black могут быть проведены дополнительно, как самостоятельные процедуры или в сочетании друг с другом.

Беспрецедентное развитие технологий, ускорение обмена информацией, глубокое погружение в социальные сети и целый ряд других факторов заставляют современного человека быть в постоянном жизненном тонусе.



**Заключение**

Конечными целями подобных протоколов становятся повышение комфорта пациента, сокращение количества визитов, многоуровневый подход, стойкий ощутимый результат и соблюдение принципов социальной сохранности внешнего вида пациентов. ●

